

# Komplettering 30 maj

- Främst från Öland, även stensöta som rullas ut, i Arboga

Blommande **knippfryle** *Luzula campestris* tagen tidigare i vår, Man ser hårigheten och blommorna med sina kalkblad med ståndare och pistiller. Blommorna är protogyna dvs. pistiller mognar ut före ståndarna.



Två plantor av den ettåriga arten **sandtimotej**, *Phleum arenarium*.

Närbilden visar den täta vippan som liknar ett ax, avsmalnande i båda ändarna och med skärmfjäll som har hår och kort borstudd.





Hos **sandstarr** *Carex arenaria* kommer de enskilda stråna upp med jämna mellanrum och växer som på snören. Svårt att se trekantigheten.

På blommande sandstarr sitter han- och honblommor på samma småax som dessutom sinsemellan är lika. Det är på fotot svårt att se att hanblommorna sitter överst i de enskilda småaxen för pistillerna täcker det mesta.







En typisk tuva av den fleråriga arten **sandsvingel**, *Festuca polesica*, med smala, stickiga blad som sticker upp ur sanden.



Sandsvingelns vippa  
med de grågröna  
småaxen som har flera  
blommor och är  
försedda med ett kort  
borst.





Sandsvingelns  
halmgula, tvärt  
avhuggna  
bladslidor som  
sitter längst ner  
på stråna.





Vippan, med de ganska stora småaxen försedda med flera långa borst, hos **raklosta**, *Bromopsis erecta*.



De vivipara  
småaxen hos  
**knölgröe**, *Poa*  
*bulbosa*.





Jämför från Öland 2015!



Det ganska  
korta, trubbiga  
snärpet hos  
**knylhavre,**  
*Arrhenatherum*  
*elatus*.





Stensötans blad rullas ut



