

Några starr-arter 230530

1. Ett enda ax – oftast med både han- och honblommor. **Nålstarr** är dock tvåbyggare. Taggstarr är ganska vanlig, ej tvåbyggare.
2. Flera ax som ser likadana ut allihop – kanske går att känna igen piggstarr, stjärnstarr, harstarr, sandstarr, gråstarr.
3. Skilda han- och honax. Ett eller flera hanax högre än honaxen.
 - 3a. Platta fruktgömmen, två märkesflikar: Hundstarr, bunkestarr, vass-starr.
 - 3b: Snarare trekantiga fruktgömmen, trekantig frukt, tre märkesflikar: Många arter, bl.a. pillerstarr, knagglestarr, hirsstarr, blekstarr, slokstarr, grusstarr, trådstarr, flaskstarr, blåsstarr.

1a: ett ax, skilda han- och honplantor

Nålstarr, *C. dioica*

Krok: Våt mark, mest myrar.

Elvers: Enda starren som är tvåbyggare!



1b: ett ax, sambyggare, han- och honblommor på samma planta.

Taggstarr, *C. pauciflora*

Krok: Myrar.



2: Flera likadana ax

Piggstarr, *C. spicata*

Krok: Gräsmark.

Elvers: Notera de klotrunda eller äggformiga taggiga axen.

Torrmarksart.



Stjärnstarr, *C. echinata*

Krok: Fuktiga ängar, kärrkanter.

Elvers: De utspärrade fruktgömmena präglar utseendet och gör namnet mycket träffande.





Harstarr, *C. leporina*

Krok: Betes- o. hällmarker, stigar.

Elvers: En av de vanligaste av de relativt få starrarter nedanför fjällen, som inte är knuten till så utpräglad våta marker som stränder eller myrar.



Sandstarr, *C. arenaria*

Krok: Sandfält vid havet; i inlandet fr.a. vid Väneren och Vättern.

Elvers: I den omgivande glesa vegetationen är de linjeraka raderna av sandstarr ofta mycket iögonenfallande.







Gråstarr, *C. canescens*

Krok: Fuktig mark.

Elvers: Färgen på axen är i början ljus grön.





3a. Skilda han- och honax, platta fruktgömmen, två märkesflikar

Hundstarr, *C. nigra*

Krok: Kärr, fuktig gräsmark.

Elvers: Stor variation.





Bunkestarr, *C. elata*

Krok: Kärr, sjöstränder.

Elvers: En av de "storstarrar" som kan vara beståndsbildande vid sjöstränder innanför vassbältet. Skarpt trekantiga strån. Vid basen gulgrå bladslidor, som i kanten är upprispade till trådnät. Ofta hanblommor upptill i honaxen. Stödbladet under nedersta honaxet nästan borstformigt, styvt, smalt och kort.



Vass-starr, *C. acuta*

Krok: Våt mark, helst stränder.

Elvers: "Storstarr" vid sjöstränder. Ej tuvor. Skarpt trekantiga strån, upptill sträva, i toppen något lutande. Basala bladslidor mörkbruna med jämna kanter. Även nedersta stödbladen är breda, platta och långa – når upp över det översta av hanaxen. Översta honaxet har ofta hanblommor överst.





3b: Skilda han- och honax, trekantig nöt och därför mer runt fruktgömmen, tre märkesflikar

- Pillerstarr, *C. pilulifera*

Krok: Hällar, skogsbackar.

Elvers: Axen tätt packade i stråtoppen. Stråna böjer sig vid fruktmognaden bågformigt utåt ned mot marken runt tuvan.





Knagglestarr, *C. flava*

Krok: Kärr, fuktig gräsmark, diken.

Elvers: Bladen förhållandevis långa och breda. Bladen liksom axen gulgröna.





Hirsstarr, *C. panicea*

Krok: Fuktiga ställen.

Elvers: Fruktgömmets korta spröt sitter snett, liten "bessemerkonverter". Grågrön, strået trubbkantigt.





Blekstarr, *C. pallescens*

Krok: Gräsmark.

Elvers: Bladen är glest håriga, mest nertill. Stödbladen under blom-axen är vid sin bas ofta tvärvågiga.



Slokstarr, *C. pseudocyperus*

Krok: Kärr, stränder.

Elvers: Hela växten rent grön. Axens skaft sitter nära varandra.



Grusstarr, *C. hirta*

Krok: Sand- eller gräsmark.

Elvers: Notera hårigheten, de vitt åtskilda axen, de torra växtplatserna.





Trådstarr, *C. lasiocarpa*

Krok: Kärr, sjöstränder.

Elvers: Blombildningen uteblir ofta, men de höga, smala gråa bladen brukar vara så talrika i kärrens gungflyn, att de lätt uppmärksammas.





Flaskstarr, *C. rostrata*

Krok: Kärr, skogstjärnar.

Elvers: Honaxen påminner om små dockskåpsmajskolvar. Stråna trubbigt trekantiga.



Blåsstarr, *C. vesicaria*

Krok: Stränder, kärr.

Växer ofta i mindre och glesare bestånd än flaskstarren. Strå med vassa, skärande kanter. Frukthömmena snett uppåt-utåtriktade, aldrig rakt utspärrade.



