

Flera gräs

- (Endast att lägga på kurs-hemsidan)
- Delvis subjektivt urval, gräs där Gunnar har foton



Flyghavre, *Avena
fatua*





Havre, *Avena sativa*





Backskafting,
Brachypodium
pinnatum



Lundskafting,
Brachypodium
sylvaticum



Sötgräs, *Cinna latifolia*





Kamäxing,
Cynosurus
cristatus



Knägräs, *Danthonia decumbens*



Myskgräs finns av olika arter, släktet *Hierochloë*





Luddtåtel, *Holcus lanatus*



Lentåtel, *Holcus mollis*



Hårig vid ledknutarna!





Strandråg, *Leymus
arenarius*



Släktet *Stipa*, fjädergräs – bilder från Frankrike resp. Bulgarien – har inte så bra från Västergötland!





Släktet *Glyceria*, glycerior

- Småax smala, mångblommiga med små skärmfjäll och ytterblomfjäll som är trubbiga eller svagt spetsiga samt trindryggade och borstlösa. Tämligen bredbladiga sump- och vattengräs.

Jättegörö, *Glyceria maxima*

- Småax brett eller äggrunt avlång, redan som unga plattade, 4 – 10 mm långa. Vippa upprätt, mycket yvig. Övre skärmfjäll 3 – 4 mm långt. Mer än manshög. Ljusgrön. Blad styva, under blanka, 7 – 15 mm breda. Vippa yvig, brunaktig. Ståndarknappar ca 1,5 mm långa. Stränder, även i vatten. Plattade bladslidor. Näst vass vårt mest storvuxna gräs.







72. JÄTTEGRÖE, GLYCERIA MAXIMA (Hartm.) Holmb.



Mannagräs, *Glyceria fluitans*

- Blad 10 – 20 cm långa, vippa gles, smal. Nedre vippgrenar 2 – 3 tillsammans. Vatten, fuktiga ställen. Ytterblomfjäll 5 – 7 mm. Småax linjärt avlånga, nästan cylindriska, minst 10 mm långa. Vatten, fuktiga ställen. Även flytblad.









71. MANNAGRÄS, GLYCERIA FLUITANS (L.) R. Br.

Högt vattenlevande gräs
med småaxen parallella
med grenarna



Släktet *Anisantha*, sollostor

- Vippor lutande, småax med långa borst. Bladslidorna bildar i nedre delen ett slutet rör. Räknades förr till släktet *Bromus*.



Taklosta

Taklosta, *Anisantha tectorum*

- Strå småludet, småax ensidigt hängande med långa borst (men inte så långa som på sandlosta). Relativt lågvuxen. Torra, helst sandiga ställen.





Sandlosta, *Anisantha sterilis*

- Ej i "Svensk Fältflora".
- Strå kalt, småax allsidigt hängande med långa borst. Ganska höga strån. 1 – 2 småax på varje vippgren. Bladen men inte småaxen mjukludna. Vägkanter, ruderatplatser och dylikt.



107 A. SANDLOSTA, *BROMUS STERILIS* L.
B. TAKLOSTA, *BROMUS TECTORUM* L.



Foderlosta, *Bromopsis inermis*

- Släktet innefattar många fleråriga arter med jordstam av varierande längd. Bladslidorna bildar i nedre delen ett slutet rör. Räknades förr till *Bromus*.
- Just foderlosta: Störväxt, oftast kal. Bredbladig med yvig vippa. Småax 2 – 3 cm, intet eller mycket kort borst. Gräsvallar, vägkanter, banvallar. Från början införd.





Ruderatgräs i kraftiga
ruggar, pyramidformad
vippa med mörka, 20-35 mm
långa småax.

Kan någon gång uppvisa
korta borst, detta verkar
dock vara mindre vanligt
i länet. Liknar ej alla
övriga Bromus-arter (L).

